

ÍNDICES DE USO SUGERIDOS PARA **QUICK-SOL**

USO AGRÁRIO

Dosagem:

Quando fungo e/ou enfermidades não estão presentes

- **Quick-Sol** deve ser agregado a água de irrigação que se costuma aplicar, em uma proporção :
 - **1.000ml a 1.500ml por hectare, por ciclo produtivo.**

Quando fungos e/ ou enfermidades estão presentes

- **Quick-Sol** deve ser agregado a água de irrigação que se costuma aplicar, em uma proporção :
 - **1.500ml a 2.000ml por hectare, por ciclo produtivo.**

PROCEDIMENTO NA APLICAÇÃO:

- Enxágüe o equipamento antes e depois do uso.
- Dissolva **Quick-Sol** em uma quantidade de água, utilizada normalmente para um hectare.
- **Quick-Sol** deve ser diluído na água limpa 1 hora antes do uso.
- Para obter melhores resultados aplique **Quick-Sol** nas primeiras horas do dia, quando o sol estiver mais suave.
- **Quick-Sol** não deve ser aplicado simultaneamente, ou ser misturado com outros fertilizantes, fungicidas, inseticidas ou nenhum outro tipo de produto agrícola.
- Para melhores resultados, aplique **Quick-Sol** 48 a 72 horas antes de irrigar.
- O **Quick-Sol** diluído deve ser usado dentro das 72 horas após a diluição.
- Não retorne o material diluído ao recipiente **Quick-Sol** original. →



Para taxas específicas da aplicação na colheita, contate por favor seu distribuidor **Quick-Sol** local, sendo que outras taxas podem ser usadas dependendo suas necessidades individuais.

APLICAÇÕES ADICIONAIS

- Aplicações adicionais não danificarão a sua colheita, plantas ornamentais, árvores, plantas, etc.
- Cada vez que forem encontrados fungos, enfermidades ou tensões climáticas, sugere-se uma dose adicional (consulte seu distribuidor local).
- **Quick-Sol** pode ser usado a cada 5 –10 dias.

Sempre experimente primeiro em umas áreas pequenas.

Leia as instruções da etiqueta no recipiente antes do uso.

A aplicação foliar e do solo é recomendada fortemente ou, na falta disto, a aplicação foliar deve ser abundante bastante que o produto alcança os solos.

*Diferentes formas e métodos de irrigação mudara dependendo do seu país.
Uma boa regra geral a ser seguida é aplicar entre 1,000 e 1,500 ml
de Quick-Sol por hectare por ciclo de produção.*



COABC

Distribuidor Mundial Exclusivo: Beyond International, Inc.

Email: beyondinternationalinc@gmail.com - info@quick-sol.com

www.quick-sol.com

ÍNDICES DE USO SUGERIDOS PARA QUICK-SOL

USO NO LAR

Quando fungos e/ ou enfermidades nao estão presentes

- Utilizar 2,5 cm³ deste produto por litro de água (Aproximadamente 2 colheres de chá a cada 4 litros de água).
- Aplique a cada duas ou tres semanas.

Quando fungos e/ou enfermidades estão presentes

- Utilizar 3,75 cm³ deste produto por litro (Aproximadamente 3 colheres de chá a cada 4 litros de água)
- Aplique a cada 10 ou 15 dias.

Esta aplicação pode ser aplicada na grama, plantas ornamentais, vegetais, frutas e nas árvores.

PROCEDIMENTO NA APLICACÃO:

- Enxágüe o equipamento usado na aplicação antes e depois do uso.
- Misture **Quick-Sol** em água limpa, seguindo as dosages indicadas acima.
- Se possível permita que a mistura envelheça 1 hora, desde o começo da preparação até a aplicação.
- Para resultados melhores, aplique durante as horas adiantadas da manhã, devido ao sol mais suave.
- **Quick-Sol** não deve ser aplicado simultaneamente, ou ser misturado com outros fertilizantes, fungicidas, inseticidas, ou o nenhum outro tipo de produto agricultural.
- Para melhores resultados, aplique **Quick-Sol** 48 a 72 horas antes de irrigar.
- A solução de **Quick-Sol** na água deve ser usada dentro das 72 horas uma vez deluida.
- Não retorne o material diluído ao recipiente **Quick-Sol** original. →



Aplicações adicionais

- Aplicações adicionais ou mais fortes não são prejudiciais.
- **Quick-Sol** pode ser aplicado a cada 5 dias.

Sempre experimente primeiro em umas áreas pequenas.

Leia as instruções da etiqueta no recipiente antes do uso.

A aplicação foliar e do solo é recomendada fortemente ou, na falta disto, a aplicação foliar deve ser abundante bastante que o produto alcança os solos.

Este produto pode ser usado dentro e ao ar livre.

Quick-Sol pode causar deterioração em vidros ou em superfícies pintadas ao entrar em contato com elas.

Não utilizar recipientes que tenham sido tratados com alcatrão.



COABC

Distribuidor Mundial Exclusivo: Beyond International, Inc.

Email: beyondinternationalinc@gmail.com - info@quick-sol.com

www.quick-sol.com