

INDICES DE USO SUGERIDOS PARA **QUICK-SOL**

Uso Agrario

DOSIS:

Cuando hongos y/ o enfermedades no están presentes

- **Quick-Sol** debe ser agregado al agua que usted acostumbra a aplicar, en una proporción de
 - **1,000 ml a 1,500 ml por hectárea, por ciclo productivo.**

Cuando hongos y/ o enfermedades están presentes

- **Quick-Sol** debe ser agregado al agua que usted acostumbra a aplicar, en una proporción de:
 - **1,500 ml a 2,000 ml por hectárea, por ciclo productivo.**

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN:

- Enjuague el equipo antes y después de la aplicación.
- Disuelva **Quick-Sol**, en la cantidad de agua, utilizada normalmente por hectárea.
- **Quick-Sol** debe ser diluido en agua limpia, al menos 1 hora antes de ser aplicado.
- Para mejores resultados aplique **Quick-Sol** durante las primeras horas del día ó al atardecer, cuando el sol es más suave.
- **Quick-Sol** NO debe ser aplicado simultáneamente, ni mezclado con fertilizantes, fungicidas, insecticidas, ni ningún otro tipo de agro-insumo.
- Si va a fertilizar, para mejores resultados aplique **Quick-Sol** 48 a 72 hrs. antes, en caso de podado también se recomienda una aplicación de Q.S. posterior al mismo.
- La solución de **Quick-Sol** en agua, se debe utilizar dentro de las 72 hrs. de diluida.
- No retorne material diluido al envase de **Quick-Sol**.

→



Para ratios de aplicación específicos por favor contacte a su distribuidor local, ya que otros ratios de aplicación pueden ajustarse a su necesidad.

APLICACIONES ADICIONALES

- Aplicaciones adicionales no dañarán su cosecha, plantas ornamentales, árboles, plantas, etc.
- Cada vez que haya hongos, enfermedades o tensiones climáticas, sugerimos una dosis adicional (consulte a su distribuidor local).
- **Quick-Sol** puede ser usado cada 5 –10 días.

Siempre tratar primero áreas pequeñas.

Lea las instrucciones de la etiqueta del envase antes de usar.

Se recomienda en lo posible aplicación foliar y radicular o en su defecto foliar abundante de manera que el producto alcance los suelos.

Debido a las diferentes formas, métodos de riego y aplicación de productos a la siembra usados en cada país. Una buena regla general a seguir es que se debe aplicar entre 1,000 y 1,500 ml. de Quick-Sol, por hectárea, por ciclo de producción.



COABC

Distribuidor Mundial Exclusivo: Beyond International, Inc.

Email: beyondinternationalinc@gmail.com - info@quick-sol.com

Website: www.quick-sol.com